

Omdat levensduur loont

Werkwijzer uiergezondheid

De uiergezondheid is een van de hoofdredenen voor gedwongen afvoer. Zowel subklinische als klinische mastitis verlagen de melkproductie en ze kosten flink wat geld. Nog los van de hoeveelheid (vervelend) werk.

“Toen de adviseur een analyse maakte van de situatie, bleek het celgetal veel meer van mij en de omgeving af te hangen dan van de leeftijd van mijn koeien. Een eye-opener!”


Wat kunnen uiergezondheidsproblemen je kosten?

- Behandelkosten plus gederfde melkproductie bij mastitis varieert van 164 tot 235 euro per geval.
- De melkderving bij subklinische mastitis bedraagt tussen 3% en ruim 12% op bedrijfsniveau.
- De kosten zijn berekend op 77 euro per koe bij een tankcelgetal van 250.000.
- Bij een structureel probleem kunnen de kosten per koe meer bedragen dan 250 euro per jaar.
- Inclusief een kortere levensduur en de lagere efficiëntie zijn de kosten nog hoger.
- Bijkomende probleem is de extra zorgtijd die kan variëren van 2,5 tot 13,5 uur per koe per jaar.


Een hoog celgetal is niet per definitie alleen een probleem van oudere koeien. Het komt in elk lactatiestadium voor. Hoe vaak en hoe ernstig bepaal je voor een groot deel zelf. Registreer en evalueer de droogstand en de behandelingen, ook bij genezing.

Waar sta jij met je bedrijf wat zou je willen bereiken?

Kenmerk	Huidige waarden	Bedrijfsdoel	Streefwaarden
% koeien afgevoerd vanwege klinische mastitis			<5%
% koeien afgevoerd vanwege subklinische mastitis			<5%
% afgevoerde koeien wegens speenproblemen			<5%
Aandeel van de totale afvoer vanwege uiergezondheid			<25%
Afvoerleeftijd van koeien vanwege uiergezondheid			



Een hoog celgetal kan je behoorlijk wat melk kosten.




Omdat levensduur loont


Hoe staat het ervoor op jouw bedrijf en wat zou je willen verbeteren?

Kenmerk	Huidige waarden	Bedrijfsdoel	Streefwaarden
Gemiddelde tankcelgetal			<150.000
Celgetal vaarzen			<100.000
Celgetal meerkalfs koeien			<150.000
% koeien met verhoogd celgetal			<10%
% koeien met mastitis			<15%
% herhalingsgevallen			<10%
% koeien met verhoogd celgetal na afkalven			<5%
% koeien met nieuw verhoogd celgetal in de lactatie			<6%
% koeien succesvol behandeld tijdens de lactatie			>85%
% herhalingsgevallen			<10%

Subklinische mastitis zie je vaak in de hele lactatie, met een piek in de eerste en laatste periode.



Subklinische mastitis is lang niet altijd een probleem van de oudere koeien. Het komt bij alle leeftijden voor.



Heb je een goed beeld van de risico's in de droogstand op je bedrijf?

Kenmerk	Huidige waarden	Bedrijfsdoel	Streefwaarden
Laag in - Laag uit			>75%
Laag in - Hoog uit			<5%
Hoog in - Laag uit			>70%
Hoog in - Hoog uit			<5%
Koeien genezen van Hoog in			>85%
Koeien met AB-houdende droogzetters			<25%

Aandachtspunten en tips

- De kans op uierproblemen is het grootst in de eerste 100 dagen.
- Een goede droogstandsevaluatie geeft meer inzicht in de oorzaken.
- Zorg voor een goede voeding, een goede waterkwaliteit en beschikbaarheid.
- Werk overal hygiënisch: het strohok, de boxen, de vloeren, de melkstal.
- Controleer de melktechniek en verwissel de tepelvoeringen tijdig.
- Voorkom hittestress, ook in de droogstand, het vermindert de weerstand.
- Houd koeien in de wei weg van plaatsen met veel vocht.
- Houd koeien met hoog celgetal apart bij het melken en in de droogstand.
- Teatsealers zijn een goede (tijdelijke) vervanging van de natuurlijke keratineplug.
- Fok niet met koeien die een structureel probleem hebben. Kijk bij de stierkeuze naar het celgetalverloop in de volgende lactaties.
- Fokken op een goede bouw van de spenen vermindert de kans op uierproblemen: niet te dik en niet te dun. Niet te stomp en niet te spits.

Wil je meer weten?

Kijk dan op www.omdatlevensduurloont.nl

